

炭酸ガスレーザー によるホクロ治療

炭酸ガスレーザーによる治療は
直径 6mm 以下の小さなホクロや
直径 6mm 以上でも盛り上がりのあるホクロ
の治療に適しています。



メリット

ほとんど出血がなく、短時間で治療が可能で、切って縫う手術と比べて、傷痕が早く治り目立たなくなります。
(通常半年～1年で傷跡は目立たなくなりますが、肌質によって例外もあります)

治療の流れ

- ① 悪性の可能性が無いかの診察を行います。
- ② 麻酔の注射をした上で、炭酸ガスレーザーの熱でホクロの細胞を蒸散させます。
- ③ キズを早く治すために、肌色のテープ(ビジダーム)を貼って終わりです。

自宅での注意点など

- ◎ 当日より入浴・洗顔ができます。
洗顔の前に必ずビジダームをはがし、泡立てた石鹸でキズをそっと洗ってください。
ぬるめのお湯で石鹸の泡をすすいたら、タオルで優しく水気をふきます。
キズより一回り大きく切ったビジダームを、キズに貼ります。
- ◎ 治療を受けてから2、3日は、キズからでる浸出液とビジダームが溶け合い、
白くドロっとした液体がビジダームの周囲に漏れ出てくる場合があります。
その場合は、ビジダームをはがして石鹸でキズを洗い、貼り直してください。
- ◎ キズは、部位や大きさによりますが、1～3週間で治っていきます。
- ◎ 治療を受けた後、1週間後と1ヶ月後に必ず受診して下さい。
その後は再発、癬痕形成などがあれば受診して頂きます。



予約は直接お電話で受付までご連絡ください。
TEL:0798-74-1331

櫻根皮膚科
Sakurane Dermatology Clinic